

## Impfungen mit modernen Impfstoffen

Krankheit	Grundimmunisierung 1. Impfung	Grundimmunisierung 2. Impfung	Grundimmunisierung 3. Impfung	Wiederholungsimpfungen
Tollwut	Ab der 7. Lebenswoche möglich	Bei Fohlen geimpfter Stuten im 9. Lebensmonat		Wiederholungsimpfungen beim Pferd alle 2 Jahre
Tetanus	Ab dem 4. Lebensmonat	4-8 Wochen nach der ersten Impfung		Im Abstand von 3 Jahren
Druse	<b>Der Impfstoff ist zur Zeit europaweit nicht lieferbar!</b>			
Hautpilz Insol dermatophyton (Dermatophyten)	1. Impfung	2 Wochen nach der ersten Impfung		Alle 9 Monate
Influenza	Ab dem 4. Lebensmonat	4 – 6 Wochen nach der 2. Impfung	Nach 6 Monaten	Jährlich <b>bei Verwendung mit Iscom- oder Rekombinante- Impfstoffen</b>
Herpes	Ab dem 3. Lebensmonat Tragende Stuten werden im ¾. bzw 7/8. Trächtigkeitsmonat geimpft	3 –4 Monate nach der ersten Impfung		Alle 6 – 9 Monate
Resequin plus Influenza kombiniert mit Herpes	Ab dem 4. Lebensmonat	4 – 8 Wochen nach der ersten Impfung	4 –6 Monate nach der 2. Impfung	Alle 6 Monate